



GUÍA DE APLICACIÓN

Esta no es la Información completa para el paciente de Androderm®. Revise la Información importante sobre riesgos y la Información completa de prescripción en www.androderm.com.

ANDRODERM®
(testosterone transdermal system)

PASO 1


PREPARACIÓN



- Antes de aplicar Androderm®, asegúrese de que el área de aplicación esté limpia, seca y que no haya piel rota. Evite áreas de la piel que sean grasosas, transpiren mucho o estén cubiertas de pelo, ya que Androderm® puede no pegarse bien en estas áreas.
- **Androderm® debe aplicarse en su espalda, área del estómago (abdomen), parte superior de los brazos o en los muslos solamente (ver A y B).**
No aplique Androderm® a ninguna otra parte del cuerpo como el escroto, nalgas o en un área con huesos.

PASO 2

ABRA LA BOLSA PLATEADA



- Rompa a lo largo del borde y retire el parche de la bolsa (ver C).
No corte la bolsa protectora de Androderm®.

LAS INSTRUCCIONES CONTINÚAN EN LA PRÓXIMA PÁGINA.

INDICACIONES

ANDRODERM® es un medicamento recetado que contiene testosterona. ANDRODERM es utilizado para tratar a hombres adultos que tienen poca o ninguna testosterona debido a ciertas condiciones médicas.

Su proveedor de atención médica examinará su sangre en busca de testosterona antes de que comience y mientras esté tomando ANDRODERM.

No se conoce si ANDRODERM es seguro y eficaz para tratar a hombres que tienen poca testosterona por la edad.

No se conoce si ANDRODERM es seguro y eficaz para niños menores de 18 años de edad. El uso inadecuado de ANDRODERM puede afectar el crecimiento óseo en los niños.

ANDRODERM es una sustancia controlada (CIII) porque contiene testosterona que puede ser un objetivo para personas que abusan de medicamentos recetados. Mantenga su ANDRODERM en un lugar seguro para protegerlo. Nunca dé su ANDRODERM a nadie más, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. Vender o dar este medicamento puede dañar a otros y es contra la ley.

ANDRODERM no está previsto para ser utilizado por mujeres.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS

¿Quién no debe usar ANDRODERM? No use ANDRODERM si usted:

- Es un hombre que tiene cáncer de mama.
- Tiene o podría tener cáncer de próstata.

- Está embarazada o puede quedar embarazada, o está amamantando. ANDRODERM puede dañar a su bebé por nacer o al bebé que está amamantando.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de usar ANDRODERM? Antes de usar ANDRODERM, dígame a su proveedor de atención médica si:

- Tiene cáncer de mama.
- Tiene o podría tener cáncer de próstata.
- Tiene problemas urinarios por una próstata agrandada.
- Tiene problemas cardíacos.
- Tiene problemas de hígado o riñón.
- Tiene problemas respiratorios mientras duerme (apnea del sueño).
- Tiene diabetes.
- Tiene alguna otra enfermedad.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que esté tomando, incluidos medicamentos recetados y no recetados, vitaminas y complementos herbales.



Usar ANDRODERM con otros medicamentos puede afectar el funcionamiento de ANDRODERM y de otros medicamentos. Especialmente, hable con su proveedor de atención médica si toma:

- Insulina.
- Medicamentos que disminuyen la coagulación de la sangre.
- Corticosteroides.

Consulte la Información adicional importante sobre riesgos en la próxima página.
Consulte la Información completa de prescripción en www.androderm.com.

PASO 3

QUITE LA PELÍCULA PROTECTORA



- Quite la película protectora de plástico y el disco de plata del parche. Sostenga las pestañas en el parche y la película protectora de plástico, y suavemente despegue la película de plástico del disco de plata del parche (ver D). Esto expondrá el área adhesiva y el depósito central en el parche (ver E).
- El parche debería despegarse fácilmente de la película protectora de plástico. **No** use el parche Androderm® si la película es difícil de separar. Deseche el parche Androderm® y obtenga uno nuevo.

Revise la película protectora de plástico. No debe ver ningún pegamento (adhesivo) adherido a la película. **No** use el parche Androderm® si ve algún rastro de adhesivo en la película. Deseche el parche Androderm® y obtenga uno nuevo. Tire también el disco de plata y la película transparente de plástico.

PASO 4

APLIQUE EL PARCHÉ

- Aplique el parche de inmediato luego de sacar el parche de la bolsa protectora y quitar la película de plástico.
- Coloque el parche de manera plana sobre la piel con la parte adhesiva hacia abajo y presione firmemente alrededor de los bordes. Asegúrese de que el parche se pegue bien a la piel.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ANDRODERM? ANDRODERM puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:

- Si usted ya tiene un agrandamiento de la próstata, sus signos y síntomas pueden empeorar cuando use ANDRODERM. Esto puede incluir:
 - Mayor necesidad de orinar por la noche.
 - Problemas para iniciar su flujo urinario.
 - Tener que orinar muchas veces durante día.
 - Tener una urgencia tal que tenga que ir al baño de inmediato.
 - Tener accidentes urinarios.
 - No poder orinar o tener un flujo de orina débil.
- Posible riesgo aumentado de cáncer de próstata. Su proveedor de atención médica debe controlar que usted no tenga cáncer de próstata o cualquier otro problema relacionado con la próstata antes de iniciar y mientras usa ANDRODERM.
- Coágulos de sangre en las piernas o pulmones. Los signos y síntomas pueden incluir dolor en las piernas, hinchazón y enrojecimiento de las piernas, dificultad para respirar y dolor en el pecho.
- Posible riesgo aumentado de accidente cerebrovascular o ataque cardíaco.
- En dosis grandes, ANDRODERM puede disminuir su conteo de espermatozoides.

- Hinchazón de sus tobillos, pies o cuerpo, con o sin insuficiencia cardíaca.
- Pechos doloridos o agrandados.
- Problemas para respirar mientras duerme (apnea del sueño).

Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los efectos secundarios graves mencionados arriba.

Los efectos secundarios más comunes de ANDRODERM incluyen:

- Enrojecimiento de la piel, irritación, ardor o ampollas en el lugar donde se aplica ANDRODERM.
- Dolor de espalda.
- Depresión.
- Dolor de cabeza.
- Anormalidades en la próstata.

Otros efectos secundarios incluyen más erecciones de lo normal para usted o erecciones que duran un largo tiempo.

Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que lo molesta o que no desaparece. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de ANDRODERM.

Consulte la información completa de prescripción en www.androderm.com.